

## มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา

### ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)

: เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด ทำความสะอาด

### ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

: ดูแลตนเอง ใช้ข้อส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก สำนวจตรวจสอบ กักกักตนเอง

### แบ่งโรงเรียนเป็น ๓ โซน ดังนี้

๑. Screening Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับ-ส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน ไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงาน เฉพาะบุคลากรที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้

๒. Quarantine Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการ สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ หรือยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อเน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble

๓. Safety Zone จัดเป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย

## แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร

### นักเรียน

๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ลดแออัด ดูแลตนเอง ใช้ข้อส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ สำนวจตรวจสอบ กักกักตนเอง

๒. วัดไข้ในเรือนพักนอนเช้า-เย็นในสัปดาห์แรก

๓. ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในสัปดาห์แรก

๔. นักเรียนที่มีความเสี่ยงจากการชักไหม้ไลน์หรือมีอาการ PUI (ไข้ ไอ จาม หวัด มี) ให้มาเข้ารับบริการที่เรือนพยาบาล แยกนอนและเรียนออนไลน์ ตรวจ ATK ด้วยตนเองใน Day ๓ และ Day ๗ หลังจากที่มีอาการ เมื่อนักเรียนตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ให้แจ้งครูเรือนพักนอนทราบ ครูเรือนพักนอนแจ้งมายังครูอนามัย ครูอนามัยประสาน รพสต.โคกสูง ครูเรือนพักนอนพาไปนักเรียนไปตรวจ (นั่งหลังกระบะหรือรถที่กั้นผนังระหว่างคนขับและผู้โดยสาร) เข้ารับการรักษาที่ รพสต.โคกสูงในช่วงเวลา ๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.

๕. สัปดาห์ที่ ๒ สุ่มตรวจ ATK จากคนที่มีเคยมีความเสี่ยง มีอาการ PUI

### ครูและบุคลากร

๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ลดแออัด ดูแลตนเอง ใช้ข้อส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ สำนวจตรวจสอบ กักกักตนเอง

๒. เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ PUI (ไข้ ไอ จาม หวัด มี) สามารถมาเข้ารับบริการที่เรือนพยาบาล หรือสังเกตตนเองที่บ้าน แจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตสอนออนไลน์ ตรวจ ATK ด้วยตนเองใน Day ๓ และ Day ๗ หลังจากที่มีอาการ ถ้าตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาและครูอนามัยให้ทราบ ครูและบุคลากรที่สะดวกเข้ารับการรักษาที่ รพสต.โคกสูง ครูอนามัยจะประสานให้

๓. ครูและบุคลากรที่ไป-กลับ ออกไปข้างนอกเป็นประจำรวมถึงแม่ค้า ให้ตรวจ ATK ด้วยตนเองทุก ๓ วัน ส่วนครูและบุคลากรที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนและไม่ได้ออกไปข้างนอกเป็นประจำให้ตรวจ ATK ด้วยตนเองทุก ๗ วัน และยืนยันผลต่อผู้บังคับบัญชา

#### **การทำความสะอาด**

เนื่องจากโคโรนาไวรัสสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน ๒ ชั่วโมง ถึง ๙ วัน หลักการในการทำลายเชื้อจะต้องใช้ในปริมาณที่สามารถฆ่าเชื้อได้ในเวลานั้น องค์การอนามัยโลกแนะนำสารที่มี

ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ ภายในระยะเวลา ๑ นาที ได้แก่ แอลกอฮอล์ ๖๒-๗๐% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๐.๑% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๐.๕%